




Prévention de l'allo-immunisation



✓ Qu'est-ce-que l'allo-immunisation?

Vous êtes de rhésus négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur vos globules rouges d'antigène rhésus.

Le géniteur de votre enfant est de Rhésus positif, ses globules rouges portent à leur surface l'antigène Rhésus. Il peut le transmettre ou non à votre enfant.



Si le hasard fait que le géniteur a transmis cet antigène à l'enfant à naître, votre système immunitaire peut produire des anticorps pour détruire les globules rouges du fœtus qui présentent l'antigène à leur surface : c'est **l'allo-immunisation anti-D**.

Ces anticorps persistent à vie et peuvent passer la barrière placentaire, entraînant un **risque d'anémie chez le bébé** en détruisant ses globules rouges.



✓ Qu'est-ce que l'immunoprophylaxie Rhésus?

C'est le fait d'**injecter un médicament** (Rhopylac®) **pour éviter de fabriquer les anticorps** qui détruisent les globules rouges présentant l'antigène Rhésus.



Comment connaître le rhésus de mon enfant ?



Il suffit de réaliser une prise de sang appelée **Génotypage Rhésus foetal** qui pourra vous être prescrite par la sage-femme ou le médecin suivant votre grossesse. Cette prise de sang peut être réalisée à partir de 11SA (semaines d'aménorrhée).

- Si la prise de sang revient positive : le bébé est considéré de rhésus positif
- Si la prise de sang revient négative : il faut réaliser une deuxième recherche de génotypage Rhésus foetal (après 15SA et au moins 15 jours après le 1er prélèvement), afin de confirmer ou non le premier résultat :
 - résultat n°2 positif : le bébé est considéré de rhésus positif
 - résultat n°2 négatif : le bébé est considéré de rhésus négatif

Le groupe sanguin de l'enfant sera systématiquement vérifié par prise de sang après la naissance.



Quelles conséquences pour ma grossesse?

Si mon enfant est considéré de rhésus négatif, il n'y a pas d'indication à une immunoprophylaxie rhésus par Rhophylac®, à aucun moment de la grossesse.

Si mon enfant est considéré de rhésus positif, il y a une indication à réaliser une immunoprophylaxie Rhésus / injection de Rhophylac® :

- Après 12SA en cas de risque de passage de globules rouges du bébé dans votre sang (saignements par voie vaginale, choc abdominal violent, version par manœuvre externe, amniocentèse, accouchement...)
- De façon systématique à 28SA

Service Maternité · Obstétrique



02 31 27 25 25



Bâtiment Sud FEH
Avenue de la Côte de Nacre
14033 Caen cedex 9

CHU
CAEN NORMANDIE

Plus d'infos
www.chu-caen.fr



Le site
de la maternité

