

Formation à la Thérapie d'Exposition Prolongée



pour le Trouble de Stress Post Traumatique

3 journées de 9h30 à 17h30 (horaires variables)

Cette formation est gratuite

La thérapie d'exposition prolongée (EP) est une thérapie protocolisée de type TCC.

Elle permet d'accompagner les personnes souffrant de TSPT à traiter émotionnellement leurs expériences traumatiques, notamment à travers l'exposition. L'EP repose sur trois composantes thérapeutiques principales :

<u>Public et Prérequis</u> : Psychologue, psychiatre ou interne en psychiatrie s'engageant à :

- suivre ou être amené à suivre des patients souffrant d'un trouble de stress post traumatique
- à venir sur l'ensemble de la formation
- à suivre au moins un patient après la formation avec supervision par le Centre Psychotrauma (au moins 4 supervisions d'1h30)
- à compléter les questionnaires de suivi pré et post formation (6mois après)

<u>Prérequis à la formation</u>: Lecture du PDF sur le diagnostic du TSPT selon le DSM-5

Intervenants: Laurent BRODIN, Delphine AVRILLON, Pierre André GOSSELIN, Théo RASCOL, psychologues

Lieu de la formation et dates : Caen (lieu précis défini en amont de la formation)

PROGRAMME

Jour 1 Accueil

Présentation du programme

Le TSPT : définition, prévalence, évaluation

Cas clinique

Données sur l'exposition

Bases conceptuelles de l'EP : La théorie de la structure de la peur

Séance 1 : accueil, anamnèse, psychoéducation et exercice de respiration

Jour 2 Séance 2 : psychoéducation, création de la hiérarchie d'exposition in vivo

Séance 3 : psychoéducation, exposition en imagination et traitement Séance intermédiaire : poursuite des expositions en imagination et in vivo

Jour 3 Séance finale : dernière exposition en imagination, revoir les progrès, rechute

Gérer les émotions complexes

Les facteurs qui freinent l'engagement

Témoignage patient

Faire attention à soi : trauma vicariant, supervision

Mots de la fin



Psychoéducation sur les réactions courantes et les facteurs de maintiens liés aux traumatismes, et sur la façon dont l'EP réduit l'intensité des symptômes



Expositions "in vivo" graduelles, répétées, prolongées et complètes aux situations, personnes ou objets qui sont objectivement sans danger ou à faible risque mais que le patient évite car liés au traumatisme.



Expositions "en imagination" répétées des souvenirs. Il s'agit d'inviter le patient à revisiter en imagination et à raconter le souvenir traumatique. S'en suit un échange avec le thérapeute pour traiter les émotions et pensées du patient